

ANCGE



Enquête Prélèvement

*Retour des fiches et
données du site
ANCGE*


Olivier BERTHOLD

Matthieu LILLETTE



Résultats en chiffre

- Plus de 8 000 chasseurs
- 34 départements concernés
- Près de 20 000 oiseaux prélevés
- Utilisation des retours de données via le site
- Un gain de temps considérable
- Traitement par le logiciel Accès
- Plus de 7 000 données traitées
- Une participation des ACM et des associations quasi nulle






Evolution du réseau

- ⊕ Près de 650 inscrits dont 150 actifs
- ⊕ 641 inscrits en 2008, 456 en 2007 (+40%)
- ⊕ Besoin des participations des associations
- ⊕ Remerciements (ACM 35, Sauvagine Vendéenne, Carex 55, FDC 55, GIC Loire 45, SICGEBLN 44, individuels)





Proportion des prélèvements 2007-2008




- Somme des prélèvements de LIMICOLE
- Somme des prélèvements de OIE
- Somme des prélèvements de PLONGEUR
- Somme des prélèvements de RALLIDE
- Somme des prélèvements de SURFACE




Répartition totale par décade

SUIVIS DECADAIRE PRELEVEMENT TOUTES ESPECES






Proportion des surfaces 2007-2008






Répartition par décade surfaces

SUIVIS DECADEIRE PRELEVEMENT SURFACE






Répartition par décades Colverts






Répartition décades Sarcelle d'hiver

SARCELLE D'HIVER DECADE






Répartition par décades siffleur






Répartition par décades pilet






Répartition par décades chipeau






Répartition par décades souchet






Répartition par décades sarcelle d'été





Proportion des plongeurs 2007-2008



MILOUIN

MILOUINAN


MORILLON

NETTE ROUSSE



Répartition décades plongeurs


SUIVIS DECADEIRE PRELEVEMENT PLONGEUR





Répartition par décades milouins


SUIVIS MILOUIN






Répartition par décades morillon

SUIVIS MORILLON





Proportion des d'oies 2007-2008



■ OIE CENDREE

■ OIE DES MOISSONS


■ OIE RIEUSE



Répartition par décades des Oies 07-08





Suivi prélèvements OIE CENDREE par décade






Proportion des limicoles 2007-2008





Répartition décades des limicoles


SUIVIS DECADEAIRE PRELEVEMENT LIMICOLE





Répartition par décades 2007-2008


SUIVIS BECASSINE DES MARAIS





Répartition par décades 2007-2008


SUIVIS BECASSINE SOURDE






Répartition par décades 2007-2008

SUIVIS VANNEAUX HUPPES






Répartition par décade 2007-2008





Répartition par décades 2007-2008


SUVIS COURLIS CORLIEUX






Répartition par décades 2007-2008

SUIVIS HUITRIER PIE





Proportion des rallidés



■ FOULQUE
MACROULE


■ POULE D'EAU

■ RÂLE D'EAU



Répartition par décade

SUIVIS FOULQUE MACROULE





Conclusions

+ 3 pics importants:

+ 3ème décade d'août dû à une excellente reproduction du Colvert et à un beau passage de souchet et de sarcelle d'hiver.

+ 2ème décade d'octobre (souchet et sarcelle)

+ 2ème et 3ème décade de décembre est dû à une poussée de froid. Significatif pour le chipeau, siffleur et la sarcelle d'hiver.



Conclusions

- ✚ Excellente année pour le colvert et le souchet
- ✚ Bonne année pour la sarcelle d'hiver, la sarcelle d'été, et le milouin
- ✚ Année très moyenne pour les limicoles hormis la bécassine des marais.
- ✚ Manque récurrent des données des associations
- ✚ **ON COMPTE SUR VOUS POUR AUGMENTER LE RETOUR DE DONNEES L'ANNEE PROCHAINE**